

Operace uší



Odstáté ušní boltce jsou častou estetickou vadou, kterou plastický chirurg často řeší již u pacientů v dětském věku. Vada bývá většinou oboustranná i když tomu tak nemusí být vždy, nebo úhel odstupu boltce může být rozdílný na obou stranách. Děti s výrazně odstálými boltci mohou být v dětském kolektivu terčem posměchu, který může vyvolat i psychické poruchy. Dítě si svou vadu prvně uvědomuje většinou až s nástupem do kolektivu ve školce nebo škole. Pokud potřeba nápravy vychází od dítěte a ne

ze strany rodičů, je možno řešit tuto vadu již okolo 6. roku věku. Pokud dítě operaci odmítá je možno korekci této odchylky odložit na jakoukoliv pozdější dobu, až bude potřeba nápravy vycházet od pacienta.

Řez je veden na zadní straně boltce, poté se vyřízne vřetenovitý pruh kůže a odpreparuje chrupavka. Nejdůležitější fází operace je remodelace chrupavky a její přiměřené přitažení do správné polohy k hlavě. Chrupavka i kůže se sešívají vstřebatelným materiálem, do záhybu na přední straně boltce vkládáme modelační vatou fixovanou nevstřebatelnou nití. Převaz provádíme na druhý den po operaci a poté po domluvě s lékařem ještě několikrát do odstranění čelenky. Speciální pooperační čelenka se ponechává 14 dní na uších a dalších 14 dní pouze na noc.

Pooperační komplikace hlavně u dětí jsou velmi vzácné, mohou to být stejně jako po každém jiném chirurgickém výkonu krvácení, infekce v ráně nebo zbytnělá jizva, případně nedostatečný estetický efekt operace.